

【立川総合病院 女性ホルモン関連薬（一部の骨粗鬆症治療薬を含む） 周術期休薬期間の目安】

※ここに挙げた薬剤は、女性ホルモンの影響により周術期等長期臥床状態の場合に血栓症のリスクを上昇させるため休薬が必要です。
 ※離床後、歩行可能となり次第再開を考慮してください。月経周期に影響する薬剤は、処方医に確認してください。

分類	一般名	商品名(青字は当院採用)	術前休薬期間の目安
卵胞ホルモン製剤	エストラジオール	エストラーナテープ	4週(手術まで余裕があれば) ※プレマリンが手術前4週以内の患者に対し 慎重投与であるため、他の卵胞ホルモン 製剤もこれに準じた
		ジュリナ錠	
		エストラジオール錠	
		ディビゲル	
		ル・エストロジェル	
	結合型エストロゲン エストリオール	プレマリン錠	休薬の必要なし
		エストリール錠	
		エストリオール錠	
		ホーリン錠	
		ホーリンV腔用錠	
	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 エチニルエストラジオール	エストリール腔錠	リスクに応じて休薬(医師に確認)
		エストラサイトカプセル	
		プロセキソール錠	
黄体ホルモン製剤	プロゲステロン	エフメノカプセル	休薬の必要なし
		ウトロゲスタン腔用カプセル	
		ルティナス腔錠	
		ワンクリノン腔用ゲル	
		ルテウム腔用坐剤	
		デュファストン錠	
		ルトラール錠	
		ノアルテン錠	
		ミレーナ	
		ヒスロン錠(5mg)	
	ジドロゲステロン クロルマジノン酢酸エステル ノルエチステロン レボノルゲストレル メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	プロベラ錠	術後1週
		メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠(2.5mg)(5mg)	
		ヒスロンH錠(200mg)	
		メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠(200mg)	
卵胞ホルモン・ 黄体ホルモン 配合剤	ノルエチステロン・ エチニルエストラジオール	フリウェル配合錠LD、ULD	術前4週、術後2週
		ルナベル配合錠LD、ULD	
		シンフェーズT28錠	
	デソゲストレル・ エチニルエストラジオール	マーベロン21、28	※ 添付文書上、手術前4週以内、手術後2週 以内の患者は投与禁忌だが、当院では 術前4週あいていない場合でも、緊急の 手術を必ずしも中止する必要はない。 気付いた時点で休薬を検討する。 その場合、リスクについて患者へ十分 説明し、同意を得ること。 また、緊急性がなければ手術の延期も 選択肢の一つとする。
		ファボワール錠21、28	
		トリキュラー錠21、28	
	レボノルゲストレル・ エチニルエストラジオール	アンジュ21錠、28錠	
		ラベルフィーユ21錠、28錠	
		ジェミーナ配合錠	
	ドロスピレノン・ エチニルエストラジオールベータデクス	ドロエチ配合錠	
		ヤーズ配合錠	
		ヤーズフレックス配合錠	
	ノルゲストレル・ エチニルエストラジオール	ブラナバル配合錠	術前4週、術後2週 ※フリウェル等に準じた
GnRHアゴニスト	酢酸ノルエチステロン・エストラジオール レボノルゲストレル・エストラジオール	メノエイドコンビパッチ	4週(手術まで余裕があれば) ※プレマリンに準じた
		ウェールナラ配合錠	
GnRHアンタゴニスト	レゴリクス ガニレリクス酢酸塩 セトロリクス酢酸塩 デガレリクス酢酸塩	スプレキュア点鼻液	休薬の必要なし
		ブセレリン点鼻液	
		ナサニール点鼻液	
		ゾラデックスLAデポ	
		リュープロレリン酢酸塩注射用キット	
		リュープリンSR注射用キット	
		リュープリンPRO注射用キット	
抗エストロゲン薬	タモキシフェン酸塩 トレミフェン酸塩 フルベストラント	タモキシフェン錠	リスクに応じて休薬(医師に確認)
		ノルバデックス錠	
		フェアストン錠	
		トレミフェン錠	
SERM (骨粗鬆症治療薬)	バゼドキシフェン酢酸塩 ラロキシフェン塩酸塩	フェソロデックス筋注	3日 ※ラロキシフェンの添付文書より 同効薬のバゼドキシフェンも半減期が同等で ありこれに準じた
		ビビアント錠	
		バゼドキシフェン錠	
その他	ジェノゲスト	エビスタ錠	休薬の必要なし
		ラロキシフェン塩酸塩錠	
		ジェノゲスト錠、OD錠 ディナゲスト錠、OD錠	

参考資料: 添付文書、インタビューフォーム、メーカー回答、HRTガイドライン2017 等
 ※注射薬は当院採用薬のみ掲載しています。